

Täystyrmäys ontelosyylille NoPoxivir[®]-valmisteella



Vihdoinkin – toimiva hoito!

Unimedica Pharma AB tuo nyt markkinoille NoPoxivir®-valmisteen, joka on kivuton ja tehokas menetelmä ontelosyylien hoitoon. NoPoxivir® on ainoa Pohjoismaissa saatavilla oleva valmiste ontelosyylien hoitoon.

Mitä ontelosyyliät ovat?

Ontelosyyli eli molluska on erään rokkoviruksen aiheuttama ihon uloimman kerroksen infektiio. Ontelosyyliän pinta on pehmeä ja kiiltävä, ja sen keskellä on pieni kuoppa.

Tässä kuopassa saattaa olla valkoista, vahamaista ainetta, joka saattaa valua painettaessa ja voi helposti aiheuttaa tartunnan. Infektio on vaaraton, mutta varsin ikävä, sillä se paranee hitaasti ja saattaa aiheuttaa arpia.



Ei pidä sekoittaa tavallisiin syyliin, joiden pinta on kovettunut.


Lapsilla ontelosyyliä on usein vatsassa, käsivarsissa, kasvoissa tai niskassa. Aikuisilla ontelosyyliä ilmenee pääasiassa sukupuolielimissä, vatsassa, ristiselässä tai reisien sisäpinnalla, jolloin kyseessä on sukupuoliteitse tarttuva tauti.

Muutaman (yleensä 4–6) päivän hoidon jälkeen alkaa elimistön oma paranemisprosessi, ja yli 80 %:ssa tapauksista ontelosyyliät häviävät jo 4 viikon kuluessa hoidon aloittamisesta.

Miten NoPoxivir[®]-valmistetta käytetään

NoPoxivir[®]-pullossa on yksinkertainen ja turvallinen levitin, joka on tarkka, helppokäyttöinen ja suojaa tervettä ihoa.

Hoidon vaiheet ovat yksinkertaiset



Kasta muovilasta Nopoxivir[®]-liuokseen. Levitin on suunniteltu niin, että se antaa aina oikean annoksen. Pullo (täytetty noin ¼) on tiivis eikä vuoda, vaikka sen kääntäisi ylösalaisin.

Levitä liuosta suoraan ontelosyylään (ei sen ympärille) lastan litteällä puolella ja anna liuoksen kuivua. Tämä kestää vain muutaman sekunnin. Levitä valmistetta kaksi kertaa vuorokaudessa, mieluiten aamulla ja illalla. Riittää yleensä yli 100 ontelosyylän hoitoon.

Lopeta hoito, kun ontelosyylä tulehtuu (alue alkaa punoittaa ja turpoaa). Tässä tapauksessa tulehdus on hyvä asia, sillä se tarkoittaa, että ontelosyylä on alkanut parantua. Tämä tapahtuu yleensä 4–6 päivän kuluessa.

Odota. Elimistö huolehtii nyt itse syylän parantamisesta. Tämä kestää useimmiten 1–5 viikkoa.

Miksi ontelosyyliä pitää hoitaa?

Elimistön näkökulmasta ontelosyyliät (kuten tavalliset syyliät) ovat lähes ”huomaamattomia”, sillä ne sijaitsevat ihon uloimmassa kerroksessa. Immuunipuolustus ei myöskään pidä infektiota merkittävänä, koska se ei uhkaa elimistöä.

Siksi ontelosyylien paraneminen kestää kauan.

Varsinkin lapset kokevat tilanteen erittäin hankalana, he häpeävät ja tuntevat mielihapaa ulkonäkönsä vuoksi. Lapsilla on usein tapana raapia näppylöitä, jolloin ne leviävät helposti muualle kehoon ja tarttuvat muihin lapsiin.

Jos ontelosyyliä raapii, ne saattavat myös elposti muodostaa iholle arpia. Punoittavat ja rikkoutuneet näppylät aiheuttavat myös helposti tartunnan. **Tartunnasta taudin puhkeamiseen kuluu 2–8 viikkoa.**



NoPoxivir® on terveydenhuollon laite, jonka teho ontelosyylien hoidossa on kliinisesti osoitettu.

Hoito estää syylien leviämistä muihin kehon osiin ja tarttumista muihin lapsiin. Enimmäishoitoaika on 14 päivää. Kysy neuvoa lääkäriltä, jos tulehdusta ei ole kehittynyt tämän ajan kuluessa.



Älä käytä

- alle 2-vuotiaille lapsille
- silmänympärysiholle
- tulehtuneille alueille (kuten tulehtuneille ontelosyylille)
- limakalvoille (suu ja sukupuolielimet)
- syylien tai liikavarpaiden hoitoon
- potilaille, joiden immuunipuolustus on heikentynyt
- keloidien (eräänlaisten arpien) hoitoon.

NoPoxivir®

*on ainoa valmiste ontelosyylien hoitoon –
hyvin siedetty, tehokas ja todistetusti nopeatehoinen*

www.nopoxivir.fi / + 358 (0) 10 325 2015

Unimedic Pharma AB

Sundbybergsvägen 1, Solna
Box 6216, 102 34 Stockholm, Sweden
+46 (0) 10-130 99 50
info@unimedicpharma.se

