



**Til pasienter, forældre eller plejere.** **DK**

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger om brugen af dette lægemiddel. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

#### Brugsanvisning

### NoPoxivir

med 5 % kaliumhydroxid

Opløsning til at påføre huden til behandling af vandvorter (mollusker).

#### Sammensætning

1 ml Nopoxivir indeholder 50 mg kaliumhydroxid.

Øvrigt indholdsstof: rensat vand.

1 pakning indeholder 2 ml opløsning til brug på huden. Flaskens låg er forsynet med en plastspatel til påføring af opløsningen.

#### HVAD BRUGES NOPOXIVIR TIL

Nopoxivir bruges udvortes til behandling af vandvorter (mollusker), en hudsygdom, som skyldes et virus.

Nopoxivir opløser celler, der er angrebet af viruset, og fremkalder derved en forsvarsreaktion i den del af huden, der er angrebet af vandvorter.

Formålet med behandlingen er at fremkalde en smertefri betændelsestilstand i et lille område. Så snart huden heler, forsvinder vandvorterne.

Bemærk: Nopoxivir egner sig ikke til behandling af almindelige vorter (verrucae). Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du eller dit barn har vandvorter eller almindelige vorter, skal du kontakte din læge, inden du bruger Nopoxivir.

#### DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NOPOXIVIR

Nopoxivir må **ikke** bruges:

- i nærheden af øjnene
- på allerede betændte vandvorter
- på slimhinder (f.eks. i munden eller området omkring kønsorganerne), åbne sår og hudafskrabninger
- til behandling af almindelige vorter, gammeldandsvorter, modermærker, ligtorne og anden hård hud
- **til spædbørn og børn under 2 år**
- hvor der er en kendt tendens til øget ardannelse (hypertrofiske ar, keloid)
- til personer med medfødt eller erhvervet immundefekt (f.eks. hiv-infektion eller behandling med lægemidler, der svækker immunsystemet), fordi der ikke er tilstrækkelig erfaring med brugen til denne patientgruppe.

#### Vær særlig forsigtig med at bruge Nopoxivir

- til behandling af vandvorter på brystet i ammeperioden. Undgå, at spædbarnet kommer i kontakt med den behandlede hud.
- til patienter med atopisk dermatitis (atopisk eksem). Nopoxivir må ikke bruges under udbrud af atopisk dermatitis.

Kontakt din læge, hvis området er angrebet af vandvorter og dermatitis.

#### Brug af Nopoxivir sammen med andre præparater

Der er ingen kendte interaktioner med andre lægemidler. Nopoxivir bør dog for en sikkerheds skyld ikke bruges samtidig med andre præparater på det samme område.

#### SÅDAN SKAL DU BRUGE NOPOXIVIR

Brug altid Nopoxivir nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. *Se også "Vigtige oplysninger om sikker brug" i begyndelsen af denne indlægsseddel.*

#### Dosering

Påfør ved hjælp af spatlen en **lille** mængde Nopoxivir **præcist** på vandvorterne to gange om dagen, og lad opløsningen **tørre**. Den tørrer i løbet af få sekunder hvis anvendt ifølge disse instruktioner.

#### Sådan bruges Nopoxivir korrekt

1. **Inden du bruger præparatet første gang**
  - Skriv dato på pakningen, når du åbner den, og kontrollér altid denne dato inden brug.
  - Nopoxivir skal bruges inden for 4 uger efter første åbning.
  - Brug altid Nopoxivir i god belysning.

2. **Fugt spatlen med Nopoxivir**

- **Placér altid Nopoxivir på en fast, vandret overflade, utilgængeligt for børn.**
- Åbn det børnesikre låg (tryk og drej samtidig mod venstre).
- Flasken har en beskyttende tragt med et lille plastrør. Når spatlen tages op, bliver overskydende væske tørrer af.

3. **Påfør Nopoxivir på vandvorterne**

- Dup alle vandvorterne med spatlens **flade side**, og lad opløsningen tørre. Fugt igen spatlen med Nopoxivir efter 1–3 vandvorter. Hvis ikke der ses en lille dråbe (på størrelse med et sandkorn) ovenpå vandvorten's midte, venligst vådgar spatulaen igen og dyp på midten af vandvorten.
- Skru låget med spatlen på igen efter brug.
- Opbevar altid Nopoxivir tæt tilsluttet og utilgængeligt for børn.

4. **Gentag behandlingen dagligt**

- Påfør Nopoxivir som beskrevet i trin 2 og **3 to gange om dagen** – det er bedst at gøre det morgen og aften.

5. **Afslutning af behandlingen**

- Hold op med at bruge præparatet, så snart der viser sig en betændelsestilstand, for det er tegn på, at vandvorten er ved at forsvinde. Betændelsestilstanden er karakteriseret ved en rødme, som varer i mindst 12 timer.
- Hold op med at bruge præparatet efter 14 dage, selv om der ikke har vist sig nogen betændelsestilstand. Spørg i så fald din læge eller apotekspersonalet til råds.

6. **Vent på, at vandvorterne forsvinder**

- Betændelsestilstanden er tegn på, at kroppen bekæmper vandvorterne. Nu gælder det

om at være tålmodig og vente på, at vandvorterne forsvinder. Når betændelsen viser sig, tager det som regel 1-4 uger, før vandvorterne forsvinder. Nopoxivir må ikke bruges på betændte vandvorter. Nopoxivir må fortsat bruges på vandvorter, der ikke er betændte, og på nye vandvorter.

#### BIVIRKNINGER

Nopoxivir tåles godt, når det bruges korrekt. Nopoxivir kan imidlertid som al anden medicin give bivirkninger.

#### Meget almindelig:

Kortvarig irritation af huden, især rødme og let svie på behandlingsstedet. Dette viser sig umiddelbart efter påføring af Nopoxivir og aftager som regel i løbet af få minutter. Hvor irriteret huden bliver, afhænger af hudens følsomhed og den mængde opløsning, der er påført. Følg derfor omhyggeligt brugsanvisningen, og brug kun en lille mængde Nopoxivir.

Forbigående betændelsesreaktioner med rødme, kløe og hævelse i området med vandvorten. Det er helt normalt og fører til, at vandvorten forsvinder. Der kan dannes en sårskorpe over den hud, der er ved at hele.

#### Ikke almindelig:

Forbigående reduceret eller øget hudpigmentering (hypo- eller hyperpigmentering).

#### Sjældent:

Årdannelse. Risikoen for ardannelse er størst, hvis man kradsrer vandvorterne åbne eller klemmer dem.

#### Hyppigheden ikke kendt:

Smertes, overfladiske hudlæsioner og hudafskalning på behandlingsstedet.

Eksem eller udslæt omkring vandvorter eller på andre steder af kroppen kan forekomme. Disse hudreaktioner tyder på, at kroppen kæmper mod den virus, der forårsager vandvorterne. Reaktionen menes ikke specifikt at være relateret til behandling med Nopoxivir, men mere sandsynligt til kroppens forsvarsmekanisme. Kontakt din læge, hvis du er usikker på årsagen til en hudreaktion, der opstår under eller efter behandling.

Hvis du oplever bivirkninger, som ikke er beskrevet i denne indlægsseddel, eller du er bekymret over behandlingen, skal du holde op med at bruge Nopoxivir og spørge din læge eller apotekspersonalet til råds.

#### OPBEVARING

Opbevar Nopoxivir utilgængeligt for børn.

Opbevar flasken tæt tilsluttet.

Opløsningen kan holde sig i 4 uger efter første åbning. Skriv dato på pakningen, når du åbner den. Udløbsdatoen er trykt på pakningen og flasken. Brug ikke præparatet efter denne dato.

**Denne indlægsseddel blev senest ændret:** August 2019.

**Til pasienter, foreldre eller omsorgspersoner.** **NO**

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder viktig informasjon om bruk av dette produktet (medisinsk utstyr). Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

#### Brugsanvisning

### NoPoxivir

med 5 % kaliumhydroksid

Opløsning til påføring på hud for behandling av mollusker (molluscum contagiosum).

#### Sammensetning

1 ml Nopoxivir inneholder 50 mg kaliumhydroksid.

Andre innholdsstoffer: rensat vann.

1 pakning inneholder 2 ml oppløsning til bruk på huden. Flaskekorken har en plastspatel for påføring av oppløsning.

#### HVA NOPOXIVIR BRUKES MOT

Nopoxivir brukes til utvortes behandling mot mollusker (molluscum contagiosum), en hudsygdom som er forårsaket av et virus.

Nopoxivir får celler som er angrepet av viruset, til å løse seg opp, og skaper dermed en forsvarsreaksjon i huden i det området som er rammet av mollusker.

Formålet med behandlingen er å fremkalle en smertefri betennelse på et lite område. Så snart dette tilheles, forsvinner også molluskene.

Merk: Nopoxivir er ikke egnet til behandling av vanlige vorter (verruca). Hvis du ikke er sikker på om barnet ditt er rammet av mollusker eller vanlige vorter, bør du oppsøke lege før du bruker Nopoxivir.

#### HVA DU MÅ VITE FØR DU BRUKER NOPOXIVIR

Bruk **ikke** Nopoxivir:

- i nærheten av øynene
- på mollusker som allerede er betente
- på slimhinner (for eksempel i munnen eller kjønnsorganene), åpne sår eller rifter
- til behandling av vanlige vorter, aldersvorter, fødselsmerker, liktorner og annen hard hud
- **til spedbarn og barn under 2 år.**
- der det foreligger kjent tendens til ardannelse (hypertrofiske arr, keloiddannelse)
- hos personer med medfødt eller ervervet immunsvikt (f.eks. HIV-infeksjon eller behandling med legemidler som undertrykker immunsystemet), siden det ikke foreligger tilstrekkelige erfaringer fra bruk innenfor denne pasientgruppen.

#### Vis særlig forsiktighet ved bruk av Nopoxivir

- ved mollusker på brystene under amming. Unngå kontakt mellom spedbarnet og den behandlede huden.



- hos pasienter med atopisk dermatitt (atopisk eksem). Nopoxivir bør ikke brukes under oppblussing av atopisk dermatitt.

Rådfør deg med lege hvis området er rammet av mollusker og dermatitt.

#### Andre produkter og Nopoxivir

Det finnes ingen kjente interaksjoner med legemidler. Som en forholdsregel bør imidlertid ikke Nopoxivir påføres på det rammede området samtidig som andre produkter.

#### HVORDAN DU BRUKER NOPOXIVIR

Brug alltid Nopoxivir nøyaktig slik dette pakningsvedlegget angir. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. *Se også "Viktig informasjon om sikker bruk" i begynnelsen av dette pakningsvedlegget.*

#### Dosering

To ganger daglig brukes spatelen til å påføre en **liten** mengde Nopoxivir bare på molluskene. La oppløsningen få **tørke**. Den vil tørke på noen få sekunder hvis den påføres i henhold til denne bruksanvisningen.

#### Slik bruker du Nopoxivir riktig

1. **Før første gangs bruk**
  - Skriv ned åpningsdatoen på esken, og sjekk alltid denne datoen før bruk.
  - Nopoxivir bør brukes innen 4 uker etter første gangs åpning.
  - Pass på at Nopoxivir brukes ved god belysning.

2. **Fukt spatelen med Nopoxivir**

- **Plasser alltid Nopoxivir på et stødig og plant underlag utilgjengelig for barn.**
- Åpne den børnesikre korken (trykk og drej mot venstre samtidig).
- Flasken har en beskyttelsestrakt med et lite plastrør. Når du trekker ut spatelen, strykes overflødig væske av.

3. **Påfør Nopoxivir på molluskene**

- Stryk oppløsningen på molluskene med den **flate siden** av spatelen, og la oppløsningen få tørke. Etter 1 – 3 mollusker fuktes spatelen med Nopoxivir igjen. Hvis ingen dråpe (på størrelse med et sandkorn) kan ses på mollusken, dypp spatelen en gang til og stryk på nytt.

- Etter bruk skrur lokket med spatelen på igjen.
- Oppbevar alltid Nopoxivir tett lukket og utilgjengelig for barn.

4. **Gjenta påføringen hver dag**

- Påfør Nopoxivir som forklart i trinn 2 og **3 to ganger daglig**. Morgen og kveld anbefales.

5. **Avslutte bruk**

- Slutt å bruke produktet så snart betennelse oppstår. Det viser at mollusken er i ferd med å forsvinne. Betennelsen er gjenkjennelig ved en rødhet som varer i minst 12 timer.
- Slutt å bruke produktet etter 14 dager, selv om det ikke har oppstått noen betennelse. Rådfør deg i så tilfelle med lege eller apotek.

6. **Vent på at molluskene forsvinner**

- Betennelsen viser at kroppen bekjemper molluskene. Så er det tid for å være tålmodig og vente på at molluskene skal forsvinne. Fra betennelsen viser seg tar det vanligvis 1 til 4 uker til molluskene forsvinner. Nopoxivir må ikke brukes på betente mollusker. Nopoxivir kan fremdeles påføres på mollusker som ikke er betente, og nye mollusker som kan oppstå.

#### MULIGE BIVIRKNINGER

Nopoxivir tolereres godt når det brukes som anvist. Som andre produkter til behandling av sykdom, kan også Nopoxivir forårsake bivirkninger.

#### Svært vanlige:

Kortvarig hudirritasjon, særlig rødhet og lette etseskader på påføringsstedet. Disse oppstår umiddelbart etter påføring av Nopoxivir på huden og går vanligvis over i løpet av et par minutter. Intensiteten av hudirritasjonen avhenger av hvor følsom huden er og mengde påført oppløsning. Du må derfor følge bruksanvisningen og påføre sparsomt med Nopoxivir.

Forbigående betennelsesreaksjoner med rødhet, kløe og hevelse i området rundt mollusken. Disse skal føre til at molluskene forsvinner. Det kan danne seg en sårskorpe på huden under tilheling.

#### Mindre vanlige:

Forbigående reduksjon eller økning i hudpigmenteringen (hypo- eller hyperpigmentering).

#### Sjeldne:

Årdannelse. Risikoen for ardannelse er større når molluskene blir klødd åpne eller klemt på.

#### Frekvens ikke kjent:

Smertes, hudlesjoner og hudavskalling på påføringsstedet.

Eksem eller utslett rundt mollusken eller på andre deler av kroppen kan oppstå. Disse hudreaksjonene indikerer at kroppen motkjemper viruset som forårsaker mollusker. Reaksjonene antas ikke å være relatert spesielt til behandlingen med Nopoxivir, men mer sannsynlig til kroppens forsvarsmekanisme. Rådfør deg med legen dersom du er usikker på årsaken til en hudreaksjon som oppstår under eller etter behandlingen.

Slutt å bruke Nopoxivir og kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

#### HVORDAN DU OPPBEVARER NOPOXIVIR

Oppbevar Nopoxivir utilgjengelig for barn.

Oppbevar flasken tett lukket.

Opløsningen har en holdbarhet på 4 uker etter åpning. Merk av åpningsdatoen på esken.

Utløpsdatoen er trykt på esken og flasken. Ikke bruk dette produktet etter utløpsdatoen.

**Oppdateringsdato:** August 2019.



#### Tilverkare/Valmistaja/Fremstiller/Tilvirker:

HÅLSA Pharma GmbH  
Maria-Goeppert-Str. 5  
D-23562 Lübeck  
Tyskland/Saksa

#### Licensgivare/Lisenssinantaja/Licensgeber:

INFECTOPHARM

Arzneimittel und Consilium GmbH  
Von-Humboldt-Str.1  
D-64646 Heppenheim  
Tyskland/Saksa

#### Distributör/Jakelija/Distributør:

Unimedica Pharma AB  
Stockholm/Tukholma  
Sverige/Ruotsi

CE 0482



571602011G05

