

Til pasienter, foreldre eller plejere.	DK
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger om brugen af dette lægemiddel. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.	
Brugsanvisning	
NoPoxivir med 5 % kaliumhydroxid	
Opløsning til at påføre huden til behandling af vandvorter (mollusker).	

Sammensætning
1 ml Nopoxivir indeholder 50 mg kaliumhydroxid.

Øvrigt indholdsstof: rensed vand.

1 pakning indeholder 2 ml opløsning til brug på huden. Flaskens låg er forsynet med en plastspatel til påføring af opløsningen.

HVAD BRUGES NOPOXIVIR TIL

Nopoxivir bruges udvortes til behandling af vandvorter (mollusker), en hudsygdom, som skyldes et virus.

Nopoxivir opløser celler, der er angrebet af viruset, og fremkalder derved en forsvarsreaktion i den del af huden, der er angrebet af vandvorter.

Formålet med behandlingen er at fremkalde en smertefri betændelsestilstand i et lille område. Så snart huden hele, forsvinder vandvorterne.

Bemærk: Nopoxivir egner sig ikke til behandling af almindelige vorter (verrucae). Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du eller dit barn har vandvorter eller almindelige vorter, skal du kontakte din læge, inden du bruger Nopoxivir.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NOPOXIVIR

Nopoxivir må **ikke** bruges:

- i nærheden af øjnene
- på allerede betændte vandvorter
- på slimhinder (f.eks. i munden eller området omkring kønsorganerne), åbne sår og hudafskrabninger
- til behandling af almindelige vorter, gammelmandsvorter, modermærker, ligtorne og anden hård hud
- til spædbørn og børn under 2 år**
- hvor der er en kendt tendens til øget ardannelse (hypertrofiske ar, keloid)
- til personer med medfødt eller erhvervet immundefekt (f.eks. hiv-infektion eller behandling med lægemidler, der svækker immunsystemet), fordi der ikke er tilstrækkelig erfaring med brugen til denne patientgruppe.

Vær særlig forsigtig med at bruge Nopoxivir

- til behandling af vandvorter på brystet i ammeperioden. Undgå, at spædbarnet kommer i kontakt med den behandlede hud.
- til patienter med atopisk dermatitis (atopisk eksem). Nopoxivir må ikke bruges under udbrud af atopisk dermatitis.

Kontakt din læge, hvis området er angrebet af vandvorter og dermatitis.

Brug af Nopoxivir sammen med andre præparater
Der er ingen kendte interaktioner med andre lægemidler. Nopoxivir bør dog for en sikkerheds skyld ikke bruges samtidig med andre præparater på det samme område.

SÅDAN SKAL DU BRUGE NOPOXIVIR

Brug altid Nopoxivir nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. *Se også ”Vigtige oplysninger om sikker brug” i begyndelsen af denne indlægsseddel.*

Dosering
Påfør ved hjælp af spatlen en **lille** mængde Nopoxivir **præcist** på vandvorterne to gange om dagen, og lad opløsningen **tørre**.

Sådan bruges Nopoxivir korrekt

- Inden du bruger præparatet første gang**
 - Skriv dato på pakningen, når du åbner den, og kontrollér altid denne dato inden brug.
 - Nopoxivir skal bruges inden for 4 uger efter første åbning.
 - Brug altid Nopoxivir i god belysning.

- Fugt spatlen med Nopoxivir**
 - Placér altid Nopoxivir på en fast, vandret overflade, utilgængeligt for børn.**
 - Åbn det børnesikre låg (tryk og drej samtidig mod venstre).
 - Flasken har en beskyttende tragt med et lille plastrør. Når spatlen tages op, bliver overskydende væske tørrret af.

- Påfør Nopoxivir på vandvorterne**
 - Dup alle vandvorterne med spatlens flade side, og lad opløsningen tørre. Fugt igen spatlen med Nopoxivir efter 1–3 vandvorter.
 - Skru låget med spatlen på igen efter brug.
 - Opbevar altid Nopoxivir tæt tillukket og utilgængeligt for børn.

- Gentag behandlingen dagligt**
 - Påfør Nopoxivir som beskrevet i trin 2 og 3 **to gange om dagen** – det er bedst at gøre det morgen og aften.

- Afslutning af behandlingen**
 - Hold op med at bruge præparatet, så snart der viser sig en betændelsestilstand, for det er tegn på, at vandvorten er ved at forsvinde. Betændelsestilstanden er karakteriseret ved en rødme, som varer i mindst 12 timer.
 - Hold op med at bruge præparatet efter 14 dage, selv om der ikke har vist sig nogen betændelsestilstand. Spørg i så fald din læge eller apotekspersonalet til råds.

- Vent på, at vandvorterne forsvinder**
 - Betændelsestilstanden er tegn på, at kroppen bekæmper vandvorterne. Nu gælder det om at være tålmodig og vente på, at vandvorterne forsvinder. Når betændelsen viser sig, tager det som regel 1-4 uger, før vandvorterne forsvinder. Nopoxivir må ikke bruges på betændte vandvorter. Nopoxivir må fortsat bruges på vandvorter, der ikke er betændte, og på nye vandvorter.

BIVIRKNINGER

Nopoxivir tåles godt, når det bruges korrekt. Nopoxivir kan imidlertid som al anden medicin give bivirkninger.

Meget almindelig:
Kortvarig irritation af huden, især rødme og let svie på behandlingsstedet. Dette viser sig umiddelbart efter påføring af Nopoxivir og aftager som regel i løbet af få minutter. Hvor irriteret huden bliver, afhænger af hudens følsomhed og den mængde opløsning, der er påført. Følg derfor omhyggeligt brugsanvisningen, og brug kun en lille mængde Nopoxivir.

Forbigående betændelsesreaktioner med rødme, kløe og hævelse i området med vandvorten. Det er helt normalt og fører til, at vandvorten forsvinder. Der kan dannes en særskorpe over den hud, der er ved at hele.

Ikke almindelig:
Forbigående reduceret eller øget hudpigmentering (hypo- eller hyperpigmentering).

Sjælden:
Ardannelse. Risikoen for ardannelse er størst, hvis man kradsrer vandvorterne åbne eller klemmer dem.

Hvis du oplever bivirkninger, som ikke er beskrevet i denne indlægsseddel, eller du er bekymret over behandlingen, skal du holde op med at bruge Nopoxivir og spørge din læge eller apotekspersonalet til råds.

OPBEVARING

Opbevar Nopoxivir utilgængeligt for børn. Opbevar flasken tæt tillukket. Opløsningen kan holde sig i 4 uger efter første åbning. Skriv dato på pakningen, når du åbner den. Udløbsdatoen er trykt på pakningen og flasken. Brug ikke præparatet efter denne dato.

Denne indlægsseddel blev senest ændret: December 2014.

Til pasienter, foreldre eller omsorgspersoner.	NO
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder viktig informasjon om bruk av dette medisinske utstyret. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.	
Bruksanvisning	
NoPoxivir med 5 % kaliumhydroksid	
Opløsning til påføring på hud for behandling av molluscum contagiosum.	

Sammensetning
1 ml Nopoxivir inneholder 50 mg kaliumhydroksid.

Andre innholdstoffer: rensed vann.

1 pakning inneholder 2 ml oppløsning til topisk påføring. Flaskekorken har en plastspatel for påføring av oppløsning.

HVA NOPOXIVIR BRUKES MOT

Nopoxivir brukes utvortes mot molluscum contagiosum, en hudlesjon som er forårsaket av et virus.

Nopoxivir får celler som er angrepet av viruset, til å løse seg opp, og skaper dermed en forsvarsreaksjon i huden i det området som er rammet av molluscum contagiosum.

Formålet med behandlingen er å forårsake smertefri inflammasjon på et lite område. Så snart dette tilheles, tilheles også molluscum-lesjonen.

Merk: Nopoxivir er ikke egnet til behandling av vanlige vorter (verruca). Hvis du ikke er sikker på om baret ditt er rammet av molluscum contagiosum eller vanlige vorter, bør du oppsøke lege før du bruker Nopoxivir.

HVA DU MÅ VITE FØR DU BRUKER NOPOXIVIR

Bruk **ikke** Nopoxivir:

- i nærheten av øynene
- på molluscum-knuter som allerede er betente
- på slimhinner (for eksempel i munnen eller kjønnsorganene), åpne sår eller rifter
- til behandling av vanlige vorter, aldersvorter, fødselsmerker samt liktorer og annen kallus-dannelse
- til spedbarn og småbarn under 2 år.**
- der det foreligger kjent tendens til arrdannelse (hypertrofiske arr, keloiddannelse)
- hos personer med medfødt eller erhvervet immunmangel (f.eks. HIV-infeksjon eller behandling med legemidler som undertrykker immunsystemet), siden det ikke foreligger tilstrekkelige erfaringer fra bruk innenfor denne pasientgruppen.

Vis særlig forsiktighet ved bruk av Nopoxivir

- ved molluscum contagiosum på brystene under amming. Unngå kontakt mellom spedbarnet og den behandlede huden.
- hos pasienter med atopisk dermatitt (atopisk eksem) Nopoxivir bør ikke brukes under oppblussing av atopisk dermatitt.

Rådfør deg med lege hvis området er rammet av molluscum og dermatitt.

Andre legemidler og Nopoxivir
Det finnes ingen kjente interaksjoner med andre legemidler. Som en forholdsregel bør imidlertid ikke Nopoxivir påføres på det rammede området samtidig som andre produkter.

HVORDAN DU BRUKER NOPOXIVIR

Bruk alltid Nopoxivir nøyaktig slik dette pakningsvedlegget angir. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. *Se også ”Viktig informasjon om sikker bruk” i begynnelsen av dette pakningsvedlegget.*

Dosering
To ganger daglig brukes spatelen til å påføre en **liten** mengde Nopoxivir **bare** på molluscum-knutene. La oppløsningen få **tørke**.

Slik bruker du Nopoxivir riktig

- Før første gangs bruk**
 - Skriv ned åpningsdatoen på esken, og sjekk alltid denne datoen før bruk.
 - Nopoxivir bør brukes innen 4 uker etter første gangs åpning.
 - Pass på at Nopoxivir brukes under godt belyste forhold.

- Fukt spatelen med Nopoxivir**
 - Plasser alltid Nopoxivir på et fast og plant underlag utilgjengelig for barn.**
 - Åpne den børnesikre korken (skvy og drei mot venstre samtidig).
 - Flasken har en beskyttelsestrakt med et lite plastrør. Når du trekker ut spatelen, strykes overflødig væske av.

- Påfør Nopoxivir på molluscum contagiosum-knuten**
 - Smør oppløsningen på molluscum-knutene med den flate siden av spatelen, og la oppløsningen få tørke. Etter 1–3 knuter fuktes spatelen med Nopoxivir igjen.
 - Etter bruk skrur lokket med spatelen på igjen.
 - Opbevar alltid Nopoxivir tett lukket og utilgjengelig for barn.

- Gjenta påføringen hver dag**
 - Påfør Nopoxivir som forklart i trinn 2 og 3 **to ganger daglig**. Morgen og kveld anbefales.

- Avslutte bruk**
 - Slutt å bruke produktet så snart betennelse oppstår. Det viser at molluscum-knuten er i ferd med å tilheles. Betennelsen er gjenkjennelig ved en rødhet som varer i minst 12 timer.
 - Slutt å bruke produktet etter 14 dager, selv om det ikke har oppstått noen betennelse. Rådfør deg i så tilfelle med lege eller apotek.

- Vent til molluscum-lesjonen er tilhelet**
 - Betennelsen viser at kroppen bekjemper molluscum-knutene. Så er det tid for å være tålmodig og vente på at knutene skal tilheles. Etter at knutene har blitt betent, tilheles de i løpet av 1 til 4 uker. Nopoxivir må ikke brukes på betente knuter. Nopoxivir kan fremdeles påføres på knuter som ikke er betent, og nye knuter som kan oppstå.

MULIGE BIVIRKNINGER

Nopoxivir tolereres godt når det brukes som anvist. Som alle andre legemidler, kan også Nopoxivir forårsake bivirkninger.

Svært vanlige:
Kortvarig hudirritasjon, særlig rødhet og lette etseskader på påføringsstedet. Disse oppstår umiddelbart etter påføring av Nopoxivir på huden og går vanligvis over i løpet av et par minutter. Intensiteten av hudirritasjonen avhenger av hvor følsom huden er og mengden påført oppløsning. Derfor må du følge bruksanvisningen og påføre Nopoxivir sparsomt.

Forbigående betennelsesreaksjoner med rødhet, kløe og hovenhet i området for molluscum-knuten. Disse skal føre til at knuten tilheles. Det kan danne seg en særskorpe på huden under tilheling.

Mindre vanlige:
Forbigående reduksjon eller økning i hudpigmenteringen (hypo- eller hyperpigmentering).

Sjeldne:
Arrdannelse. Risikoen for arrdannelse er større når molluscum-knutene blir klødd åpne eller klemt på.

Slutt å bruke Nopoxivir og kontakt lege eller apotek dersom du oplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

HVORDAN DU OPPBEVARER NOPOXIVIR

Oppbevar Nopoxivir utilgjengelig for barn. Oppbevar flasken tett lukket. Opløsningen har en holdbarhet på 4 uker etter åpning. Merk av åpningsdatoen på esken. Utløpsdatoen er trykt på esken og flasken. Ikke bruk dette produktet etter utløpsdatoen.

Oppdateringsdato: Desember 2014.

Tillverkare/Valmistaja/Fremstiller/Tilvirker:

HÅLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Str. 5
D-23562 Lübeck
Tyskland/Saksa

Licensgivare/Lisenssinantaja/Licensgiver:

INFECTOPHARM
Arzneimittel und Consilium GmbH
Von-Humboldt-Str.1
D-64646 Heppenheim
Tyskland/Saksa

Distribütör/Jakelija/Distributor:

Unimedic Pharma AB
Box 6216
102 34 Stockholm/Tukholma
Sverige/Ruotsi

